

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.





DEUXIÈME SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Elle correspond à la première période de la morphogenèse primaire.


Durant la deuxième semaine du D E, le blastocyste subit plusieurs modifications, les plus importantes sont :

- LA NIDATION.
- LA PRÉ-GASTRULATION.
- L'ÉBAUCHAGE DES DIFFÉRENTES ANNEXES EMBRYONNAIRES.

ÉTAT PRÉALABLE DE LA PAROI UTÉRINE

Chez la femme, la nidation a lieu au 7^e jour du D E correspondant au 21^e jour du cycle menstruel. A ce moment, la paroi utérine présente les caractéristiques suivantes :

- le myomètre se relâche.
- les glandes à glycogène excrètent du glycogène et du mucus.
- les cellules de la couche fonctionnelle deviennent déciduales.
- les artères de la couche fonctionnelle deviennent spiralées.



Etat préalable de la paroi utérine au cours de la nidation

NIDATION

Au 7^e jour il y'a fixation et implantation du blastocyste dans la couche fonctionnelle de l'endomètre (C F E).

Le but est la mise en place de l'ébauche du placenta indispensable pour le développement embryonnaire.

MÉCANISME ET ASPECT MORPHOLOGIQUE DE LA NIDATION

AU 7^e JOUR

Le blastocyste se fixe à l'épithélium utérin par l'intermédiaire du **trophoblaste** qui coiffe le bouton embryonnaire et s'enfonce dans la C F E.

Le trophoblaste se différencie en deux couches :

- une couche interne cellulaire dite **cytotrophoblaste**.
- une couche externe syncytiale dite **syncytiotrophoblaste**.

AU 8^e JOUR

Les deux tiers du blastocyste sont nidés.

AU 9^e JOUR

Des lacunes syncytiales apparaissent dans le **syncytiotrophoblaste**.

2

AU 10^e JOUR

Le blastocyste s'agrandit et atteint une taille de 0.4 mm.

A ce stade il est entièrement nidé et l'orifice d'entrée de l'épithélium utérin se cicatrise.

ENTRE LE 11^e et LE 13^e JOUR

Des vaisseaux sanguins maternels s'ouvrent dans les lacunes syncytiales : **Lacunes sanguines**.

Formation des **villosités placentaires** : des **travées cytotrophoblastiques**, entourées par le **syncytiotrophoblaste**, s'enfoncent entre les lacunes syncytiales.

AU 14^e JOUR

Achèvement de la nidation.

PRÉGASTRULATION

7^e JOUR : Le bouton embryonnaire se différencie en un **germe (disque) didermique** constitué par :

- **éctophylle** : feuillet externe formé de grandes cellules.
- **entophylle** : feuillet interne formé de petites cellules.

ÉBAUCHAGE DES ANNEXES**FORMATION DE L'AMNIOS**

8^e JOUR : Le **cytotrophoblaste** au dessus de l'**éctophylle** se différencie en **amnioblastes**.

Les **amnioblastes** élaborent le **liquide amniotique** qui occupe une **cavité amniotique** dont le plancher est l'**éctophylle**.

amnioblastes et cavité amniotique = amnios.

FORMATION DU MÉSENCHYME

10^e JOUR : Le **cytotrophoblaste** autour de la cavité blastocystique se différencie en une **membrane de Heuser** à l'origine de **mésenchyme**.

13^e jour : Le **mésenchyme** se multiplie et s'installe entre :

- les **amnioblastes** et
- le **cytotrophoblaste**.

14^e jour : le **mésenchyme** s'étale sur une grande surface.

le **mésenchyme** se creuse de petites cavités.

15^e JOUR : CONDENSATION DU MÉSENCHYME

Le **mésenchyme** se creuse d'une cavité appelée **cœlome externe** puis se condense en quatre lames :

- **pédicule de fixation**,
- **somatopleure extra embryonnaire**,
- **splanchnopleure extra embryonnaire**,
- **Lame chorale**.

FORMATION DU LECITHOCÈLE



5^e JOUR : formation de la cavité blastocystique.

10^e JOUR : La cavité blastocystique devient **Lecithocèle I aire**. Il est limité par l'**entophylle** et la **membrane de Heuser**.

Entre 13^e et 14^e JOUR : Le **lecithocèle I aire** devient **Lecithocèle II aire**. Il est limité par l'**entophylle**.

ÉBAUCHAGE DE L'ALLANTOÏDE

16^e JOUR : L'**entophylle** s'évagine en **allantoïde** du côté caudal (pédicule de fixation) de l'embryon.




3


TROISIÈME SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

A la fin de la deuxième semaine (15^e jour) le germe (disque) didermique est compris entre 2 cavités :

- la cavité amniotique du côté dorsal,
- le lecithocèle secondaire du côté ventral.



Embryon humain au 15^e jour du D E




Aspect tridimensionnel d'un embryon humain au 15^e jour du D E

La troisième semaine correspond à la deuxième période de la morphogenèse primaire.



Durée : elle se déroule entre le 16^e et le 22^e jour.

Mécanisme : gastrulation (transformation du germe didermique en germe tridermique.)



Le 16^e jour l'embryon se caractérise par :

- une augmentation de la taille d'environ 2 mm,
- un changement de forme pour devenir ovalaire
- une région céphalique + large que la région caudale.
- un épaissement ectophyllique dans sa région caudale.



Embryon humain au 15^e j Embryon humain au 16^e j


C H E B A B - 3^e SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

5

FORMATION DE LA LIGNE PRIMITIVE ET DU NŒUD DE HENSEN

Le 16^e j se creuse dans la région caudale de l'**éctophylle**, un sillon longitudinal médian : c'est la ligne primitive (L P) qui croît en direction du centre de l'**éctophylle**.

La formation de la ligne primitive s'achève le 17^e j par la mise en place du nœud de Hensen (N H) du côté céphalique de la ligne primitive.



Aspect tridimensionnel d'un embryon humain au 17^e j du D E

MISE EN PLACE DU MÉSOBLASTE INTRA-EMBRYONNAIRE


Entre le 17^e et le 18^e jour du D E :

Toutes les cellules **éctophylliques** à potentialité **mésoblastique** pénètrent en profondeur, à travers la ligne primitive et s'insinuent entre l'**éctoblaste** et l'**endoblaste** excepté deux régions où l'**éctoblaste** et l'**endoblaste** restent collés au niveau de :

- la région céphalique pour former la membrane pharyngienne (ébauche de la bouche),
- la région caudale pour former la membrane cloacale (ébauche de l'an).

Le 18^e jour du D E, l'**éctophylle** est à l'origine de : l'**éctoblaste**, le **mésoblaste** et le **canal chordal**.


6



MISE EN PLACE DU MATÉRIEL CHORDAL

Entre le 17^e et le 18^e jour du D E :

Toutes les cellules ectophylliques à potentialité **chordales** pénètrent à travers le nœud de Hensen obliquement et axialement vers l'avant pour former le **CANAL CHORDAL** le 18^e jour.



Vue dorsale d'un embryon humain de 18 jours.

Le 19^e jour

Processus de fissuration longitudinale du plancher du canal chordale et du toit du lecithocèle II aire (endoblaste) pour former le **CANAL CHORDAL FISSURE**.

Le 20^e jour

Tout le plancher du canal chordal fissuré et le toit du lecithocèle secondaire en dessous disparaissent. Pour former la **GOUTTIERE CHORDALE RENVERSEE**.

Le 21^e jour

La gouttière chordale s'étale sous forme d'une plaque allongée, pour former la **PLAQUE CHORDALE**.

La plaque chordale occupe la région médiane du toit du lecithocèle secondaire tout en maintenant sa continuité avec l'endoblaste.

Le 22^e jour

La plaque chordale se détache de l'endoblaste et s'enroule sur elle-même pour former la **TIGE PLEINE**.

A mesure que se détache la chorde, l'endoblaste rétabli sa continuité.

MISE EN PLACE DU MATÉRIEL PRECHORDAL

Le 18^e jour du D E, le mésoblaste entre le canal chordal et la membrane pharyngienne se différencie en **matériel prechordal**.

C H E B A B - 3^e SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

